

S
M

V
A

marinas
playeras
costeras
humedales

Albatros de Galápagos (*Diomedea irrorata*)
Petrel ecuatoriano (*Pterodroma phaeopygia*)
Paíño de Elliot (*Oceanites gracilis*)
Rabijunco dorsibarrado (*Phaëton aethereus*)
Pingüino de Galápagos (*Spheniscus mendiculus*)
Pelicano pardo (*Pelecanus occidentalis*)
Piquero de Nazca (*Sula granti*)
Piquero pardo (*Sula leucogaster*)
Fragata magnífica (*Fregata magnificens*)
Págalo pomarino (*Stercorarius pomarinus*)
Gaviota rabihorcada (*Creagrus furcatus*)
Tiñosa parda (*Anous stolidus*)
Gaviotín común (*Sterna hirundo*)
Garza tricolor (*Egretta tricolor*)
Flamenco tosado (*Phoenicopterus ruber*)
Pato americano (*Anas americana*)
Falaropo cuellirrojo (*Phalaropus lobatus*)
Martín-pescador norteño (*Ceryle alcyon*)
Cormorán neotropical (*Phalacrocorax brasilianus*)
Pato-aguja americano (*Anhinga anhinga*)
Zambullidor piquigrueso (*Podilymbus podiceps*)
Cigüeñuela americana (*Himantopus mexicanus*)
Gallito de ciénaga suramericano (*Jacana jacana*)
Picotijera americano (*Rhynchops níger*)
Ibis blanco (*Eudocimus albus*)
Carrao (*Aramus guarauna*)
Barraquete aliazul (*Anas discors*)
Águila pescadora (*Pandion haliaetus*)
Polla azul (*Porphyrio martinicus*)
Guaco manglero (*Nyctanassa violacea*)
Chilacoa arda (*Aramides wolfi*)
Ostrero pío americano (*Haematopus palliatus*)
Chorlitejo piquigrueso (*Charadrius wilsonius*)
Aguja moteada (*Limosa fedoa*)
Becasa piquicorta (*Limnodromus griseus*)
Mariamulata (*Quiscalus mexicanus*)
Espiguero de Tumaco (*Sporophila insulata*)
Reinita manglera (*Dendroica erithachorides*)
Reinita cabecidorada (*Protonotaria citrea*)
Colibrí manglero (*Lepidopyga lilliae*)

AVES MARINAS PELÁGICAS

Permanecen durante largos períodos en mar abierto, lejos de las costas. Algunas sólo regresan a tierra, en islas remotas, para reproducirse.

Albatros de Galápagos

Diomedea irrorata



Grande, de plumaje pardo con la cabeza blancuzca y el pico amarillo largo y fuerte. Se reproduce en algunas islas lejanas en las Galápagos y vaga por el Pacífico ecuatorial. Planea sobre el mar con sus largas alas extendidas durante largos períodos. Se alimenta de peces y calamares que toma de la superficie.

Petrel ecuatoriano

Pterodroma phaeopygia



Mediano, de plumaje oscuro por encima y blanco por debajo como otros petreles, apenas se distingue por su línea infraalar más larga. Se reproduce en algunas islas de las Galápagos y Hawai. La mayor parte del año vaga por el Pacífico alimentándose de peces y calamares.

Paño de Elliot

Oceanites gracilis



Pequeño, de cola cuadrada, plumaje negruzco con la rabadilla, el centro del abdomen y las coberteras infraalares blancas. Endémica en el área de la corriente de Humboldt. Se alimenta de peces y crustáceos pequeños que obtiene aleteando sobre la superficie. Sigue a las embarcaciones en busca de desecho.

Rabijunco dorsibarrado

Phaëton aethereus



Mediano, la mitad de su longitud se debe a las rectrices centrales que le dan su nombre. Blanco, con una línea ocular, la punta de las alas y finas barras dorsales negras. Habita en el Atlántico y el Pacífico ecuatoriales. Se reproduce en islas rocosas. Se alimenta principalmente de peces.

Pingüino de Galápagos

Spheniscus mendiculus



El pingüino más pequeño y menos austral. Carece de áreas implumes en la base del pico y su línea blanca en la cabeza es muy delgada. Se reproduce durante casi todo el año en las Galápagos, desde donde se desplaza, ocasionalmente, hacia el norte llegando hasta Panamá. Puede verse con poca frecuencia en el Pacífico colombiano. Persigue, a veces en forma gregaria, escuelas de peces, principalmente sardinas y mújoles.

AVES MARINAS COSTERAS

Se alejan poco de la plataforma continental hacia las zonas pelágicas y no frecuentan los humedales continentales

Pelícano pardo

Pelecanus occidentalis



Grande, de plumaje pardo con la cabeza y el lado del cuello blancos. Habita toda la costa Pacífica americana, pero la Atlántica sólo hasta el norte de Brasil. Formaciones en línea patrullan a lo largo de la costa

Piquero de nazca

Sula granti



Grande, de plumaje blanco con las rémiges y las rectrices (excepto el par central) negras, y un área implume de color gris azulado bordeando el pico. Esta forma, separada recientemente del Piquero enmascarado, es endémica en el área de la corriente de Humboldt. Pesca zambulléndose desde una altura considerable.

Piquero pardo

Sula leucogaster



Más pequeño que el Piquero de Nazca, tiene el plumaje pardo oscuro con el abdomen blanco, y el área implume de color amarillento alrededor del pico. Es una especie pantropical que pesca zambulléndose desde alturas más bajas y en ángulos más oblicuos que el de Nazca.

Fragata magnífica

Fregata magnificens



Grande y ligera como una cometa, su silueta negra de largas alas puntiagudas con una angulosidad marcada en su parte media y la cola fuertemente ahorquillada son sus características principales. Es propia de los mares tropicales, siendo común en el Atlántico y el Pacífico. Toma el alimento con su largo pico cuando es abundante y superficial; de lo contrario practica el cleptoparasitismo.

Págalo pomarino

Stercorarius pomarinus



Mediano, tiene el dorso pardo, la cabeza negra, un amplio collar y el centro del pecho y del abdomen blancuzcos, y lo más característico, las rectrices centrales alargadas y retorcidas. Cosmopolita y omnívoro (también cleptoparásito), anida en la tundra ártica e inverna en los mares tropicales, pero se ve poco en ambas costas colombianas.

Gaviota rabihorcada

Paracheirodon axelrodi



Mediana, un tercio mayor que la Reidora, se le asemeja en apariencia pero tiene el cuello oscuro (no blanco como aquella). Endémica del área de la corriente de Humboldt, se reproduce principalmente en las Galápagos, pero también en otros lugares (Malpelo). De hábitos nocturnos, se alimenta de peces y calamares.

Tiñosa parda

Anous stolidus



Un gaviotín mediano, de plumaje pardo oscuro con la coronilla blanca, el pico muy delgado. Pantropical, se reproduce en algunas islas en ambos mares colombianos. A menudo activa en la noche, se alimenta de peces pequeños.

AVES DE HUMEDALES COSTEROS

Frecuentan diversos tipos de humedales en la costa o cerca de ella, salinos y no salinos, ej., manglares, lagunas, estuarios, pantanos, ríos y arroyos, pero muy raramente penetran al interior del continente.

Gaviotín común

Sterna hirundo



Relativamente pequeño, es un típico gaviotín blanco con el lomo y la parte superior de las alas grises, coronilla negra, y la cola fuertemente hendida. Cosmopolita, anida en la zona templada e inverna en los mares tropicales. Suele verse en bandadas pescando o descansando. Vuela ágilmente con fuerte batido y a menudo se cierne para acechar sus presas.

Garza tricolor

Egretta tricolor



Mediana, de plumaje azul grisáceo con áreas blancas en el cuello y el abdomen, salpicados con tintes rufescentes. Se encuentra a lo largo de las costas tropicales de ambos océanos. Se observa usualmente solitaria pescando en aguas someras, pero anida en colonias en los manglares. Común en la Guajira.

Flamenco rosado

Phoenicopterus ruber



Grande, uno de los flamencos más rosados, y el único que se encuentra en el Caribe. Antiguamente, más ampliamente distribuido en la costa colombiana, llegaba hasta el dpto. del Atlántico, hoy su población se reduce cada vez más a una pocas ciénagas de la Guajira. También existen colonias en las Galápagos pero nunca se desplazan hasta el continente.

Pato americano

Anas americana



Mediano, el macho es inconfundible con su lomo pardo rojizo, el cuello más claro y la coronilla blanca y una amplia y larga banda ocular verde. En vuelo, ambos sexos exhiben una amplia banda blanca en las coberteras de las secundarias, y verde en las secundarias. Anida en Norteamérica e inverna en Centroamérica y las Antillas, llegando hasta el Caribe colombiano.

Falaropo cuellirrojo

Phalaropus lobatus



Pequeño, tiene las partes superiores grises con líneas y marcas anaranjadas, garganta y abdomen blancos, un babero castaño en el cuello; pico recto y delgado. Anida en la tundra. En América inverna en el área de la corriente de Humboldt; en el Pacífico colombiano se observa como transeúnte. Pese a su apariencia de playero, prefiere nadar gracias a sus patas semilobuladas.

Martín-pescador norteño

Ceryle alcyon



Pequeño, las partes superiores gris azulosas, y las inferiores y un collar blancas, una banda gris azulosa en el pecho; la hembra además tiene una banda castaña en el abdomen. Se reproduce en Norteamérica e inverna en Centroamérica, llegando hasta el Caribe colombiano, donde se observa con poca frecuencia en manglares.

AVES DE HUMEDALES COSTEROS Y CONTINENTALES

Frecuentan una amplia variedad de humedales costeros y continentales, llegando hasta la región altoandina

Cormorán neotropical

Phalacrocorax brasilianus



Tamaño mediano y plumaje oscuro con una línea blanca muy delgada en la base de la mandíbula. Se encuentra desde el mar hasta los 4000 m de altitud en toda Suramérica, Centroamérica y parte de las Antillas. Suele formar enormes bandadas y es una de las especies más abundantes aún en áreas afectadas por la intervención humana. Se alimenta de una amplia variedad de animales acuáticos, principalmente peces.

Pato-aguja americano

Anhinga anhinga



Grande, de plumaje negro con un brillo verdoso, con numerosas rayas blancas en la nuca y la región escapular, cuello y pico como de garza, cola larga. Habita en humedales continentales no salinos desde el nivel del mar hasta la zona andina. Se sumerge completamente mientras pesca.

Zambullidor piquigrueso

Podilymbus podiceps



Mediano, de plumaje pardo con el centro del abdomen blancuzco, una banda oscura en el pico es su distintivo. Habita en variados humedales en todo el continente desde el nivel del mar hasta la zona altoandina. Estrictamente acuático, sólo sale de su hábitat para moverse vía aérea hasta otro lugar.

Cigüeñuela americana

Himantopus mexicanus



Mediana, de plumaje blanco con el lomo y las alas negras, patas muy largas de color rojizo, pico negro, delgado y recto. Habita en humedales someros especialmente en tierras bajas por toda la América tropical.

Picotijera americano

Rhynchops níger



Mediano, las partes superiores negras, la frente y partes inferiores blancas, pico rojo con punta negra, la mandíbula más larga que la maxila. Común en humedales costeros y continentales, característico su hábito de volar cerca del agua con su mandíbula “rayando” la superficie

Ibis blanco

Eudocimus albus



Mediano, plumaje blanco con las puntas de las alas negras, pico y área facial implume rojos. Gregario, en humedales someros de la costa y el interior en el sur de Norteamérica, Centroamérica y el norte de Suramérica.

Carrao

Aramus guarauna



Grande, de plumaje pardo con rayas blancas en la cabeza y el cuello. Semeja un ibis pero tien el pico más grueso. Común en humedales someros de la costa y el interior por toda la América tropical. Parcialmente nocturno se suele encontrar en forma solitaria buscando caracoles que son su alimento preferido.

Barraquete aliazul

Anas discors



Mediano, el macho se distingue por su cabeza gris con una media luna blanca delante de los ojos, el resto del plumaje pardo con manchas y rayas negras, un parche azul en el borde anterior del ala y un speculum verde visibles cuando vuela. Anida en Norteamérica e inverna en la América tropical, donde es uno de los patos migratorios más abundantes. La cacería y la contaminación de los humedales ha reducido notablemente sus poblaciones.

Águila pescadora

Pandion haliaetus



Mediana, de plumaje blanco con el dorso y las alas pardo oscuras, una línea parda a través de los ojos. Cosmopolita, anida en la zona templada e inverna por largas temporadas en las regiones tropicales en lagunas y ríos continentales hasta altitudes mayores de 3000 m.

Polla azul

Porphyrio martinicus



Pequeña, de apariencia muy delgada, plumaje azul purpurescente, con el dorso y las alas verde bronceado, pico rojo con punta amarilla y un casquete frontal azul claro. Patas amarillas con dedos largos que le permiten caminar entre la vegetación emergente en humedales someros. Común en tierras bajas, pero se observa con poca frecuencia en humedales altoandinos

Guaco manglero

Nyctanassa violacea



Mediano, de plumaje gris azulado claro, la espalda y las alas pardo oscuras con rayas claras, la cabeza negra con una cresta amplia y una línea postocular blancas. Principalmente nocturna y solitaria, habita en humedales someros especialmente manglares en toda la América tropical.

Chilacoa parda

Aramides wolfi



Pequeña, de plumaje pardo oscuro con la cabeza y el cuello grises. Tímida, se escucha mucho más de lo que se ve, en manglares y vegetación ribereña en la región del Pacífico, donde suele andar por el suelo buscando cangrejos que constituyen su principal alimento.

AVES PLAYERAS

Aves que frecuentan las playas costeras o de humedales continentales y los pantanos someros

Ostrero-pío americano

Haematopus palliatus



Mediano, el plumaje pardo oscuro por encima y blanco por debajo con la cabeza y el cuello negros, el pico rojo, los ojos amarillos y las patas rosadas. Habita la línea costera del continente americano. Individuos solitarios o parejas recorren las orillas buscando moluscos.

Chorlitejo piquigrueso

Charadrius wilsonius



Pequeño, de plumaje pardo por encima y blanco por debajo, la frente blanca y una banda pectoral negra. Residente y migratorio en ambas costas colombianas. Parejas o pequeños grupos recorren las playas en busca de alimento.

Aguja moteada

Limosa fedoa



Mediana, de pico muy largo, ligeramente recurvado, plumaje pardo rojizo densamente moteado de negro por encima, suavemente por debajo. Cría en Norteamérica e inverna en ambas costas en Centroamérica, llegando ocasionalmente a Colombia y un poco más al sur.

Becasa piquicorta

Limnodromus griseus



Pequeña, el plumaje de invierno gris pardusco por encima y claro por debajo, pico largo negro y patas verdosas. Cría en Alaska y Canadá e inverna en las costas de la América tropical, transeúnte común y visitante en ambas costas colombianas.

PÁJAROS COSTEROS

Aves terrestres que viven en hábitats ribereños,
principalmente manglares

Mariamulata

Quiscalus mexicanus



Mediana, el plumaje del macho es negro purpurescente brillante, con una cola larga medio enrollada en sus bordes, los ojos amarillos; la hembra es más parda. Habita en las dos costas de la América tropical. Gregaria y ruidosa, emite unos trinos variados, a veces estridentes, especialmente en sus sitios de dormir. Suele vagar por las playas buscando alimento.

Espiguero de tumaco

Sporophila insulata



Diminuto, el plumaje del macho es gris pardusco por encima, con la rabadilla y las partes inferiores castañas, alas y cola negruzcas con una mancha blanca en el borde del ala. Endémico de la isla de Tumaco en el Pacífico colombiano.

Reinita manglera

Dendroica erithachorides



Diminuta, de plumaje amarillo con un capuchón castaño cuando es propia del Caribe, o sólo la coronilla castaña si habita en el Pacífico. Restringida a los manglares es abundante y característica de estos ecosistemas.

Reinita cabecidorada

Protonotaria citrea



Pequeña, de plumaje amarillo, el lomo oliva y el centro del abdomen blanco. Cría en Norteamérica e inverna en Centro y el norte de Sudamérica en una amplia variedad de hábitats, pero es mucho más numerosa en los manglares.

Colibrí manglero

Lepidopyga lilliae



Diminuto, de plumaje verde brillante por encima y azul por debajo, la cola hendida de color negro azulado. Endémico de los manglares al oriente de la desembocadura del río Magdalena hasta Riohacha.